

Tijm (*Thymus*)

ALGEMENE SLEUTEL

- Stengel duidelijk vierkantig, enkel op ribben lange haren, rest (zijden) kaal; bladschijf 6-18 mm; tanden bovenste kelkclip langer dan breed
- Stengel nauwelijks vierkantig, rondom behaard :
 - + blad boven kaal, schijf 5-10 mm, lijn-lancetvormig tot smal elliptisch, met duidelijk verdikte bladnerven; tanden bovenste kelkclip lengte = breedte
 - + blad boven (meestal) behaard, schijf 3-11 mm, eirond-elliptisch (grootste breedte midden); tanden bovenste kelkclip langer dan breed

Grote tijm

Wilde tijm


Kruiptijm

Opmerking :

Bij de determinatie dient de beharing van de stengel bekeken te worden, bij voorkeur op het tweede stengellid onder de bloeiwijze.

Tijm (*Thymus*)

- Enkel beharing op ribben



Grote tijm (*Thymus pulegioides*)


stengel enkel aan ribben met lange haren

blad 6-18 mm, met nauwelijks uitspringende zijnerfen



Tijm (*Thymus*)

- Rondom behaarde stengel



Wilde tijm (*Thymus serpyllum*)

blad 5-10 mm
lijn-lancetvormig tot
smal-elliptisch



*blad 5-10 mm,
onderzijde met
uitspringende
zijnerfen*



Kruiptijm (*Thymus praecox*)

blad 3-11 mm
eirond-elliptisch
grootste breedte midden



Grote tijm (*Thymus pulegioides*)

Familie

lipbloemenfamilie (*Lamiaceae*)

Diagnostische kenmerken

Bloestengels vierkantig, alleen op de ribben behaard.

Planten meestal min of meer opgericht.

Bladen tamelijk dun en slap, eirond tot elliptisch, zelden smaller, van onderen met niet of nauwelijks verdikte nerven.

Hoogte bloeiende plant

8 - 40 cm.

Bloeitijd

Juli - september

Levensvorm

Chamaefyt (winterknoppen boven de grond)

Standplaats


Droge graslanden, taluds, duinen, kalk- of schistrotsen.



*Bloestengel
vierkantig, alleen op
de ribben behaard*

Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	4	4
●	1971-'94	70	70
●	1995 - ...	11	11



Wilde [kleine] tijm (*Thymus serpyllum*)

Familie

lipbloemenfamilie (*Lamiaceae*)

Diagnostische kenmerken

Planten dichte zoden vormend.

Bladen elliptisch tot lijnvormig, van onderen met duidelijke verdikte nerven, van boven kaal.

Bovenste kelktanden ongeveer even lang als breed.

Hoogte bloeiende plant

5 - 25 cm.

Bloeitijd

Juli - september

Levensvorm

Chamaefyt (winterknoppen boven de grond)

Standplaats

Graslanden op iets zure waterdoorlatende bodem; thermofiel.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	5	5
●	1995 - ...	1	1



Kruiptijm (*Thymus praecox*)

Familie

lipbloemenfamilie (*Lamiaceae*)

Diagnostische kenmerken

Planten tamelijk losse zoden vormend.
Bladen elliptisch tot bijna rond, met aan de onderzijde nauwelijks verdikte nerven, van boven meestal behaard.
Bloemen bovenste kelktanden duidelijk langer dan breed.

Hoogte bloeiende plant

5 - 25 cm.

Bloeitijd

Juni - juli

Levensvorm

Chamaefyt (winterknoppen boven de grond)

Standplaats

Graslanden en kalkhellingen op kalkhoudende bodem, vooral op krijt.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	0	0
●	1995 - ...	0	0



Geen waarnemingen in Limburg