

Klaproos (*Papaver*)

<i>Papaver</i>	Bastaard- klaproos (<i>P. hybridum</i>)	Bleke klaproos (<i>P. dubium</i>)	Grote klaproos (<i>P. rhoeas</i>)	Ruige klaproos (<i>P. argemone</i>)	Slaapbol (<i>Papaver somniaferum</i>)
beheading bloemstengel	behaard	aangedrukt behaard	afstaand of aangedrukt behaard	behaard	kaal
bloem	kroonbladen niet overlappend	bleek rood, soms donkerrood, soms aan de voet zwart gevekt	donkerrood, soms roze, soms wit, aan de voet met zwarte vlek	donkerrood, aan de voet soms geel	wit, lila, paars, aan de voet zwart, soms rood
bloeiperiode	mrt-mei	mei-aug	mei-jul	mei-jul	jun-aug
stempelschijf		4-6 stralen groen/bruin	6-13 stralen zwart/paars	5-9 stralen	opstaande rand
doosvrucht		knotsvormig, meer dan 2x zo lang als breed	bolvormig	heeft enkele gekromde stijve haren	bol-eivormig
bladen	met weinig zachte haren bezet, niet stengelomvattend	zonder eindlob, niet stengel- omvattend	gezaagde, weinig gedeelde eindlob, niet stengel- omvattend	dubbel veerdelig, niet stengel- omvattend	dubbel veer- kartig/veerlobbig, blauwgroen, stengelomvattend


Grote klapproos

(*Papaver rhoeas*)

bloem 7-10 cm,
kroonbladen
overlappend

doosvrucht
rondachtig, kaal
6-13 stralen

bloemsteel
afstaand
behaard



Papaver rhoeas


Bleke klapproos

(*Papaver dubium*)

bloem 3-7 cm,
kroonbladen **niet**
overlappend

doosvrucht
langwerpig, kaal,
4-6 stralen

bloemsteel
aangedrukt
behaard



P. dubium



Ruige klaproos

(*Papaver argemone*)

bloem 2-6 cm

doosvrucht met
stijve borstelharen,
5-9 stralen

stengelblad dubbel
veerspletig, eindslip
plotseling in een
stijve punt
versmallend




E. B. 643. *Papaver Argemone*. Long-prickly-headed Poppy.

Slaapbol

(*Papaver somniferum*)

bloem bleeklila
of wit

stengelbladen
met 2 stengel-
omvattende
oortjes



P. somniferum

Grote klaproos (*Papaver rhoeas*)

Familie

papaverfamilie (*Lamiaceae*)

Diagnostische kenmerken

Stengelbladen met een duidelijke, weinig gedeelde eindlob, deze gezaagd, niet stengelomvattend, behaard.

Doosvrucht minder dan 2 maal zo lang als breed; stempelstralen (6-)8-13, meestal zwartpaars, elkaar deels bedekkend.

Bloemstelen met afstaande of aangedrukte haren.

Kroonbladen scharlakenrood, aan de voet vaak zwart gevlekt, of bij tuinplanten met witte, oranje, donker- en lichtrode of gevulde bloemen.

Wortelrozet tijdens de bloei verschrompeld, planten eenjarig.

Hoogte bloeiende plant

30 – 60 cm.

Bloeitijd

Juni - juli

Levensvorm

Therofyt (eenjarig)


Standplaats

Korenvelden, wegbermen, braakland, ruderaal plaatsen, bij voorkeur op goede grond.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	368	368
●	1995 - ...	190	190



Bleke [Kleine] klaproos (*Papaver dubium*)

Familie

papaverfamilie (*Lamiaceae*)

Diagnostische kenmerken

Stengelbladen zonder duidelijke eindlob, deze veerdelig met gave of weinig gekartelde slippen, niet stengelomvattend, behaard.

Doosvrucht meer dan 2 maal zo lang als breed; stempelstralen 5-9, groenachtig of bruin, elkaar niet of weinig bedekkend.

Bloemstelen met aangedrukte haren. Kroonbladen meestal bleek scharlakenrood, soms donkerder, soms aan de voet zwart gevlekt.

Wortelrozet tijdens de bloei verschrompeld, planten eenjarig.

Hoogte bloeiende plant

30 – 60 cm.

Bloeitijd

Juni - juli

Levensvorm

Therofyt (eenjarig)


Standplaats

Graanvelden, wegbermen, braakland.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	217	217
●	1995 - ...	156	156



Ruige klaproos (*Papaver argemone*)

Familie

papaverfamilie (*Lamiaceae*)

Diagnostische kenmerken

Helmdraden naar boven verbreed.

Doosvrucht met enkele naar boven gekromde stijve haren bezet, knotsvormig, 1,5-2 cm lang; stempelschijf 4-6-stralig.

Kroonbladen donker scharlakenrood, aan de voet al of niet zwart.

Bladen niet stengelomvattend, dubbel veerdelig, de eindslippen plotseling in een stijve punt versmald, behaard.

Wortelrozet tijdens de bloei verschrompeld, planten eenjarig.



Hoogte bloeiende plant

15 – 30 cm.

Bloeitijd

Mei - juli

Levensvorm


Therofyt (eenjarig)

Standplaats

Korenvelden, droge wegbermen, spoorwegballast.

Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	2	2
●	1971-'94	152	152
●	1995 - ...	25	25



Slaapbol (*Papaver somniferum*)

Familie

papaverfamilie (*Lamiaceae*)

Diagnostische kenmerken

Stengelbladen stengelomvattend, kaal, dubbel-gekarteld tot veerlobbig, blauwgroen.

Kroonbladen hetzij wit tot bleek lila, aan de voet lila en dan de zaden wit, of blauwachtig-rood tot paars, aan de voet zwart en dan de zaden blauw; bij sommige cultivars zijn de bloemen gevuld en helderrood.

Doosvrucht bol- tot eivormig, de stempelschijf met opstaande, geplooiden randen.

Wortelrozet tijdens de bloei verschrompeld, planten eenjarig.

Hoogte bloeiende plant

20 – 120 cm.

Bloeitijd

Juni - augustus

Levensvorm

Therofyt (eenjarig)

Standplaats

Puinhoven, nabij woningen. Zeer variabele soort met talrijke ondersoorten en cultivars.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970		
●	1971-'94		
●	1995 - ...		

Geen gegevens.